

دستورات قبل از بیوپسی کلیه

1. اخذ رضایت نامه از ولی بیمار
 2. آزمایشات PT, PTT, U/A, Platelet, CBC انجام و نتیجه آن آماده باشد.
 3. رزرو دو واحد خون
 4. هماهنگی با سرویس بیهوشی
 5. هماهنگی با سرویس سونوگرافی
 6. هماهنگی با سرویس پاتولوژی
 7. NPO از 6 ساعت قبل از بیوپسی
 8. IV Line + وصل سرم Maintenance
 9. 30 دقیقه قبل Premed به بیمار تزریق شده باشد شامل:
 - پتدین 1-2mg/kg
 - پرومتازین 1mg/kg
 - کلرپرومازین 0/5-1mg/kg
 - میدازولام 0/15mg/kg-IM
- مجموعاً در یک سرنگ عضلانی تزریق شود.

- قبل از تزریق بیمار ادرار کرده و مثانه اش را تخلیه نماید.
- تزریق این داروها در زمانی است که بیوپسی بدون حضور همکاران بیهوشی انجام شود.

10. دستگاه سونوگرافی پورتابل بالای سر بیمار آماده باشد.
11. دستگاه فشار سنج مناسب یا مانیتورینگ برای کنترل مرتب فشار خون همراه بیمار باشد.